

< 新規受託項目のお知らせ >

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 このたび、新たに下記項目の検査受託を開始することとなりました。
 取り急ぎご案内させていただきますので、ご利用の程よろしくお願
 い申し上げます。

敬具

記

《実施日》

2019年6月3日（月）受付分より

《新規受託項目》

項目名	AIRS(男性8種)	AIRS(女性9種)
セット内容	AICS(男性5種) AILS(3種)	AICS(女性6種) AILS(3種)
項目コード	—	
検体/保存	EDTA-2Na加血漿 0.5 mL / 凍結	
容器	容器番号 6	
検査方法	LC/MS	
基準値	なし	
所要日数	10~13日	
検査機関	SRL	
実施料/判断料	未収載	
備考	<検体の取扱いについて> ・EDTA-2Na入り採血管(容器番号6)に血液5mLを採取後、血液を2~3回転倒混和して下さい(ローラー混和は行わないで下さい)。 ・混和後直ちに(1分以内)採血管を氷冷(血液の液面まで氷水につかる状態)又は、専用の冷却ボックスに入れて下さい。	

- * 予約検査になりますので、必ず事前にご連絡下さい。
- * 検査ご依頼の際は、No.1臨床検査総合依頼書の指示事項欄に「AIRS男性8種」「AIRS女性9種」とご記入下さい。
- * **年齢・性別・採血時間**を必ず明記して下さい。
- * 新規受託に伴い、現在受託している「AIRS男性」「AIRS女性」は受託を中止させていただきます。
- * 詳細は裏面をご参照下さい。

《AIRS(アミノインデックス[®])リスクスクリーニング》

血液中のアミノ酸バランスから、現在・将来のさまざまな疾患リスクを一度に評価する検査です。現行のAICS、AILS(糖尿病リスク)、AILS(アミノ酸レベル)に新たにAILS(脳心疾患リスク)が追加され、三大疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞)のリスク評価が可能になりました。アミノインデックス[®]は味の素(株)に委託して解析されています。

●AICS[®](AminoIndex[®] Cancer Screening)

現在がんである可能性を評価する検査です。

AICS男性5種：胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、前立腺がん

AICS女性6種：胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん、子宮がん・卵巣がん*

*子宮がん・卵巣がんにつきましては、各部位を個別に評価できません。両部位合わせての評価となります。

●AILS[®](AminoIndex[®] LifeStyle diseases)

10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク(AILS(脳心疾患リスク))、4年以内に糖尿病を発症するリスク(AILS(糖尿病リスク))と、大切な栄養素である必須・準必須アミノ酸が現在血液中で低下していないか(AILS(アミノ酸レベル))を評価する検査です。

AILS(糖尿病リスク)とAILS(アミノ酸レベル)の評価結果に基づきⅠ～Ⅳのタイプに分類し、このタイプをもとに「AILS[®]生活改善ガイド」を提供いたします。併せてAILS(脳心疾患リスク)の結果に基づく評価を行います。

●AICS[®]・AILS[®]の対象となる評価項目・対象年齢

AIRS[®]は下記年齢の日本人(妊娠されている方を除く)を対象として開発された検査です。これらの方以外は評価対象外となります。

検査項目		評価対象	対象年齢
男性	AICS 男性5種	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん	25～90歳
		前立腺がん	40～90歳
	AILS(脳心疾患リスク)	10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク	30～74歳
	AILS(糖尿病リスク)	4年以内に糖尿病を発症するリスク	20～80歳
AILS(アミノ酸レベル)	血液中の必須・準必須アミノ酸のレベル		
女性	AICS 女性6種	胃がん、肺がん、大腸がん、膵臓がん、乳がん	25～90歳
		子宮がん・卵巣がん	20～80歳
	AILS(脳心疾患リスク)	10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク	30～74歳
	AILS(糖尿病リスク)	4年以内に糖尿病を発症するリスク	20～80歳
AILS(アミノ酸レベル)	血液中の必須・準必須アミノ酸のレベル		

*脳卒中・心筋梗塞の方(治療中も含む)のAILS(脳心疾患リスク)値、糖尿病の方(治療中も含む)のAILS(糖尿病リスク)値や検査結果に基づくタイプは評価対象外となります。

*AICS[®]・AILS[®]の検査結果はその他の検査結果、臨床所見等を考慮して総合的にご判断下さい。

●受託における注意点

1. 妊娠されている方、授乳中の方、がん患者(治療中も含む)の方、先天性代謝異常の方、透析患者の方は、検査結果に影響があるため、検査の実施はご遠慮下さい。
2. 検査前8時間以内に、水以外(食事、サプリメント等)は摂取せず、午前中に採血して下さい。検査前日の高タンパク質の食事も避けて下さい。また、当日朝の運動はお控え下さい。
3. 薬剤による本検査への影響はわかっておりません。
4. 強溶血検体や、EDTA-2Na入り採血管(容器番号6)以外での受託はできません。
5. AILS[®]単独での受託はできません。AICS[®]のみの受託は可能です。